

PADRÃO DE RECIDIVA DE DOENÇA E SEUS FACTORES PREDITIVOS EM DOENTES COM CANCRO DA MAMA LOCALMENTE AVANÇADO SUBMETIDAS A QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE SEGUIDA DE CIRURGIA E RADIOTERAPIA ADJUVANTE

Saraiva S, MD, MSc¹; Ulrich J, MD, MSc¹; Jorge M, MD¹; Mendonça V, MD¹; Mareco V, MD¹; Pina F, MD, HoD¹

¹ Serviço de Radioterapia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, FPF-Lisboa, Portugal

CENTRO HOSPITALAR
LISBOA NORTE, EPE



OBJECTIVOS

Avaliar o padrão de progressão de doença e seus factores preditivos em doentes com carcinoma invasivo da mama em estádio II-III submetidas a quimioterapia neoadjuvante (NA), seguida de cirurgia e radioterapia adjuvante loco-regional.

MÉTODOS

Foi realizada uma análise observacional, longitudinal e retrospectiva das doentes observadas no nosso serviço e que cumpriam os seguintes critérios:

- diagnóstico de carcinoma da mama entre Outubro de 2012 e Dezembro de 2014;
- submetidas a quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia e radioterapia adjuvante loco-regional.

RESULTADOS (I)

Cumpriram os critérios um total de **87 doentes**.

Estádio clínico

estádio II	41,4% (n=36)
estádio III	56,3% (n=49)

Cirurgia

mastectomia	86,2% (n=75)
cirurgia conservadora	13,8% (n=12)

Estádio patológico

resposta patológica completa	20,7% (n=18)
estádio I	18,4% (n=16)
estádio II	36,8% (n=32)
estádio III	21,8% (n=19)

Foram isoladas e analisadas as doentes com **doença residual** (77%; n=67).

RESULTADOS (II)

Follow-up mediano: 70 meses.

Recidiva (n=13)

Incidência cumulativa

aos 5 anos	17,9%
------------	--------------

Padrão

loco-regional	1,5% (n=1)
distância	16,4% (n=11)
indeterminado	1,5% (n=1)

Factores preditivos

análise bivariada

tumor multicêntrico	<i>p=0,004</i>
margens cirúrgicas positivas	<i>p=0,013</i>
invasão linfovascular	<i>p=0,002</i>
status ypN	<i>p=0,023</i>
estádio patológico	<i>p=0,006</i>

análise multivariada

invasão linfovascular	<i>p=0,006</i>
-----------------------	----------------

Sobrevivência livre de doença

aos 5 anos	82,1%
------------	--------------

Sobrevivência global

aos 5 anos	86,6%
------------	--------------

CONCLUSÕES

As doentes com carcinoma invasivo da mama localmente avançado tratadas com quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia adjuvante loco-regional apresentam um **padrão de progressão de doença** que se manifesta sobretudo à **distância**.

A **recidiva de doença** associa-se a múltiplos factores tais como a **multicentricidade**, o **estado das margens operatórias**, a existência de **invasões linfovasculares**, o **envolvimento ganglionar** e o **estádio da doença**.